

اس وائرل سیزن میں بچوں کا خیال رکھنا

بہت سے وائرس جیسے نزلہ، زکام، آر ایس وی اور کووڈ 19 کا گھر پر ہی اور دی کاؤنٹر ادویات سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ گاڈیڈ ایک بیمار بچے کا خیال رکھنے میں آپ کی مدد کرے گی اور بتاتی ہے کہ کب ڈاکٹر سے طبی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔

کب اور کہاں سے مدد حاصل کی جائے

911 کال کریں یا ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ جائیں جب:

- جب آپ فکر مند ہوں کہ آپ کا بچہ شدید بیمار ہے
- آپ کے 2 ماہ سے کم عمر بچے کو بخار ہے
- آپ کا بچے کو سانس لینے میں دشواری ہے، جیسا کہ پسلیوں کے درمیان کا اندر چلے جانا، چھاتی کی ہڈی کے اوپر یا نتھنوں کا پھولنا
- آپ کو خدشہ ہے کہ بچہ کو پانی کمی / ڈی ہائڈریشن ہو گئی ہے۔ (بچے سے انکار، 8 گھنٹے یا اس سے زائد پیشاب کا نہ آنا، یا کم عمر بچے کے لئے اس سے کم گھنٹے پیشاب کا نہ آنا)
- بچہ ریسپانس نہیں دے رہا یا کم ریسپانسو ہے، بہت زیادہ سو رہا ہے اور جگانا مشکل ہے، یا اپنی طرح ظاہر نہیں کر رہا

اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کریں یا واک ان کلینک میں جائیں جب:

- بخار 2 دن سے زیادہ رہے
- مسلسل کھانسی جو کم نہ ہو رہی ہو
- بخار جو ایک دن یا اس سے زائد عرصہ میں (بنا ادویات) کے چلا جائے اور 24-48 گھنٹوں میں پھر واپس آجائے
- کان کا درد جو 2 دن سے زیادہ رہے

کمیونٹی کثیر آپشنز

مسسی ساگا پیڈریاٹریکس کثیر کلینک: اس کلینک پر ایوانٹنمنٹ دستیاب ہیں 6 ماہ کی عمر کے بچے سے لے کر 17 سال کی عمر تک کے بچے کے لئے۔ آن لائن بک کرائیں summersvillefht.com پر۔

فیملی ڈاکٹرز، واک ان کلینکس یا ورجنل کلینک: وزٹ کریں centralwesthealthline.ca یا mississaugahalthline.ca

ہیلتھ 811: رجسٹر شدہ نرس سے رات دن محفوظ اور رازدارانہ طبی مشورہ کئے مفت رابطہ کریں۔ ڈائل کریں 811 یا وزٹ کریں Health811.ontario.ca

کوئزروے ہیلتھ سینٹر پر فوری طبی نگہداشت کے کلینک: روزانہ 3 تا 9 بجے تک کھلے ہیں جو غیر جان لیوا بیماریوں اور چوٹوں کے لئے نگہداشت فراہم کرتے ہیں۔

اپنے بیمار بچے کا خیال رکھنا

- بخار: بخار اور درد کا علاج کریں اور دی کاؤنٹر ادویات جیسا کہ Tylenol (acetaminophen) یا Advil (ibuprofen) سے دی گئی ہدایات کے مطابق۔

• بھری ہوئی ناک: saline drops استعمال کریں یا رنژنگ اسپرے، چھوٹے بیز کے لئے ایک ہیومیڈیفائیر یا nasal aspirator

• کھانسی: کھانسی کا علاج ایک ہیومیڈیفائیر یا شاور کی اسٹیم سے کریں۔ بارکنگ کف یا آواز والی کھانسی کے لئے باہر کی ٹھنڈی ہوا مؤثر ہے۔ کھانسی کی ادویات 6 سال سے کم عمر بچے کو تجویز نہیں کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ایک سال کی عمر سے بڑا ہے تو ایک سے دو چائے کے چمچ شہد دینا مددگار ہو سکتا ہے۔ شہد کبھی بھی 12 ماہ سے کم عمر بچوں کو نہیں دینا چاہئے۔ botulism کے رسک کی وجہ سے بیز کے لئے یہ منع کیا جاتا ہے۔

• ممانعت: اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ بہت سے ممانعت کا استعمال کر رہا ہے۔ بے بیز کے لئے بریسٹ ملک یا فارمولہ کافی ہے۔ بڑے بچوں کے لئے، پاپسیکلز، سوپ، پیڈیلائٹ اچھے آپشن ہیں پانی کے ساتھ ساتھ۔ اگر بچہ پینا نہیں چاہتا ہے تو چھوٹے گھونٹ ہر 5 یا 10 منٹ بعد چمچ یا سرنج سے کارآمد ہو سکتے ہیں۔

آپ بیماری سے محفوظ رہنے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں:

- بچوں کی اندرونی جگہوں پر ماسک پہنیں
- اکثر اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے دھوئیں؛ اگر یہ مہیا نہیں تو ہینڈ سینٹائزر استعمال کریں
- گھر پر رہیں جب آپ بیمار ہیں یا اگر آپ ماسک نہیں پہن سکتے
- کھانسی یا چھینک اپنی کہنی میں لیں

بخار

بخار کیا ہے؟

بخار ایک علامت ہو سکتا ہے کہ جسم ایک انفیکشن کے خلاف لڑ رہا ہے۔ بخار ینگ اور صحت مند بچوں میں عام ہوتا ہے۔ عام طور پر بخار نقصان دہ نہیں ہوتا اور اس کا گھر پر علاج کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ بخار کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ زیادہ بیمار ہے۔ ایک بچہ جو بظاہر ٹھیک ہے لیکن اس کو بخار زیادہ ہے یہ کم پریشان کن بات ہے اس سے کہ بچہ کو درمیانہ یا کم بخار ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں اور کم رسپانس دے رہا ہے۔

درجہ حرارت جو 38°C (100.4°F) یا اس سے زیادہ ہو بخار ہے۔

بخار چیک کرنے کے تجویز کردہ طریقہ کار		عمر
متبادل: بغل	سب سے زیادہ درست: ریکٹل / پاخانہ کی جگہ (نیچے کی جگہ)	نوڈائیدہ بچے سے 2 سال کی عمر تک
متبادل: کان، بغل	سب سے زیادہ درست: ریکٹل پاخانہ کی جگہ	2-5 سال کی عمر
متبادل: کان، بغل	سب سے زیادہ درست: منہ کے ذریعے	5 سال کی عمر سے بڑے بچے

سادہ ڈیجیٹل تھرما میٹر بہترین ہوتے ہیں ریکٹل، بغل اور منہ کے ذریعے درجہ حرارت لینے کے لئے۔ کان کے ذریعے درجہ حرارت لینے والے تھرمامیٹر بہت چھوٹے بچوں کے لئے مؤثر نہیں ہیں۔ ماتھے یا چوسنی والے تھرمامیٹر استعمال نہ کریں وہ کسی بھی عمر کے لئے درست اور قابل اعتبار نہیں ہیں۔



بخار کا علاج کرنا

• کپڑے بہت ہلکے یا ایک تہہ کے ہونے چاہئے

• زیادہ مائع پیش کریں

• گیلا کپڑا رکھنے سے گریز کریں۔ اس سے بخار کم نہیں ہوتا اور ممکن ہے اس سے بچہ کے بیرونی جسامت ٹھنڈی ہو جائے اور اس سے وہ غیر آرام دہ محسوس کریں

• ادویات پیش کریں جیسا کہ acetaminophen (Tylenol) یا ibuprofen (Advil/Motrin) جو کہ آگٹھی لی جا سکتی ہوں یا کچھ گھنٹوں کے فرق سے اگر ضرورت ہو تو۔ بخار کے علاج کے لئے ASA (Aspirin) استعمال نہ کریں۔ اسٹور برانڈ کی ادویات اتنا ہی کام کرتی ہیں جتنا کہ بڑے برانڈ کی ادویات۔

• 3 ماہ سے 6 ماہ کی عمر کے بچوں کو صرف acetaminophen دیں۔ 6 ماہ کی عمر سے زیادہ کے بچوں کو دی جا سکتی ہے acetaminophen اور/یا ibuprofen اور ان کو ضرورت کے مطابق ادل بدل کیا جا سکتا ہے۔



بچے کی ادویات نہیں مل رہی ہیں یا معلوم نہیں کہ کس مقدار میں دوا دی جائے؟

وزٹ کریں thp.ca/emergency یا مزید معلومات کے لئے کیو آر کوڈ اسکین کریں، جس میں شامل ہیں دوا کی مقدار کا چارٹ اور تصاویر جن سے رہنمائی مل سکتی ہے یہ جانچنے میں کہ آپ کے بچے کو ایمر جنسی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔

ہم 240+ زبانوں میں ترجمہ کی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اپنے کثیر پرووائیڈر سے پوچھیں۔

امسحی للحصول على الترجمة باللغة العربية

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

扫码查看中文翻译



Balavez pour traduction en français

Escanee el código para ver la traducción al español